

1



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เตือนคุณ

กัด

ข่วน

เสีย



แม้เป็นแผลเพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ!!

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

2

เมื่อถูก กัด ข่วน เสีย



1

ล้างแผล ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบา ๆ หลาย ๆ ครั้ง



2

ใส่ยาเบตาดีน
บริเวณที่ถูกกัด ข่วน



3

กักสัตว์เลี้ยงเพื่อสังเกตอาการ 10 วัน
หากตายภายใน 10 วัน ต้องติดต่อปศุสัตว์ในพื้นที่
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4

ไปพบแพทย์
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และตามนัดทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



นำสุนัขแมวทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง

พาสุนัข แมวไปรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 2 - 4 เดือน
และกระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง ตามที่แพทย์นัด
และปีถัดไปฉีดกระตุ้นซ้ำ ปีละ 1 ครั้ง ทุกปี



ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

คาถา ๕ ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า



อย่า!
เหยียบ
ให้สุนัขตกใจ



อย่า!
แหย่
ให้สุนัขโมโห

อย่า! หยิบ
แย่งจานอาหาร



อย่า! แยก
สัตว์ที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า



อย่า! ชุ้ง
สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
www.odpc9.org



ก้าวทันโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา



คำแนะนำ

เมื่อถูกกัด ข่วน เลีย

คำแนะนำเมื่อถูกกัด ข่วน เลีย



ล้างแผล

ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา

ใส่ยาเบตาดีน
บริเวณที่ถูกกัด ข่วน



กักหมา และแมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตาย
ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า



ไปพบแพทย์

เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และมาตามนัดทุกครั้ง



ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
และตรงตามนัด

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง

- ✓ นำสุนัข หรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ✓ เลี้ยงในรั้วบ้าน ออกนอกบ้านต้องใช้สายลากจูง
- ✓ ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
- ✓ ทำหมันคุมกำเนิด



พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ ทันที



โรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)

เกิดจาก

เชื้อไวรัสเรบีส์ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระแต
ลิง ชะนี วัว และควาย เป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข

การติดต่อ

- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน
- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือน้ำลายสัตว์
กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วน หรือ จมูก ปาก และตา
- ✓ ติดต่อดูดนมจากเต้านม สัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า
- ✓ ติดต่อดูดนมจากเต้านม สัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า

อาการป่วย ที่พบในคน



มีไข้



เจ็บคอ



อ่อนเพลีย



คันบริเวณแผล



กลัวแสง / กลัวลม



เบื่ออาหาร



กระวนกระวาย



กลัวน้ำ



หนาวสั่น



หายใจขัด

เสียชีวิต

*** ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
ติดต่อแสดงอาการ
เสียชีวิตทุกราย



28 กันยายน
 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

โรคพิษสุนัขบ้า

ภัยใกล้ตัว จากสัตว์เลี้ยงแสนรัก

! แค่ถูก กัด ข่วน เลีย ก็เสี่ยงตายได้!

เลี้ยงอย่างถูกวิธี

พาสัตว์เลี้ยงไป
 ฉีดวัคซีนเมื่ออายุ
 2 เดือน และฉีดซ้ำ
 ตามนัด

ลดจำนวนด้วย
 การทำหมัน

พาไปข้างนอก ควรใช้สายจูง

เมื่อโดนกัด ข่วน รับเลย!



ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาดและสบู่
 เบาๆ ประมาณ 15 นาที



ใส่ยา

ทาแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ
 เบตาดีน



กักหมา

กักสัตว์เพื่อสังเกต
 อาการ 10 วัน



หาหมอ

พบแพทย์ทันที และให้
 ประวัติการฉีดวัคซีน



ฉีดวัคซีนให้ครบ

ฉีดวัคซีนให้ครบและ
 ตรงตามนัดทุกครั้ง



FACEBOOK



WEBSITE

28 กันยายน

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก



111 ปี ไทยร่วมใจ จัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

ป้องกันสัตว์เป็นโรคพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทำหมันถาวร หากพบสัตว์ตายผิดปกติให้ส่งไปตรวจหาเชื้อ

ป้องกันการถูกกัด



อย่าแหย่
ให้สัตว์โมโห



อย่าเหยียบ
ให้สัตว์ตกใจ



อย่าแหยก
สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบ
แย่งจานอาหาร



อย่ายุ่ง
กับสัตว์ที่ไม่รู้จัก

ป้องกันหลังถูกกัด



ล้างแผล
ด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบา ๆ
หลาย ๆ ครั้ง นานประมาณ 15 นาที



ใส่ยา
เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ



กักหมา
เพื่อสังเกตอาการ 10-15 วัน



หาหมอ
เพื่อเข้ารับการรักษา



ฉีดวัคซีนให้ครบ



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วไม่หาย เสียชีวิตอย่างเดียว!

คำแนะนำ ผู้รักสุนัขและแมว

ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า



- นำสุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนและครั้งต่อไป ตามกำหนด และฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี
- เมื่อสัตว์ได้รับวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมาย ประจำตัว และเก็บใบรับรองการฉีดไว้

อย่าให้สัตว์เลี้ยง สุนัข แมว
ไปคลุกคลีและสัมผัสสัตว์จรจัด



เลี้ยงสัตว์รับผิดชอบ

- ไม่ปล่อยสุนัขให้ไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะลำพัง
- ออกนอกบ้านให้ใส่สายจูง
- คำนึงสุนัข
- ดูแลเลี้ยงสัตว์ รักษาความสะอาด ปราศจากเห็บหมัด ถ่ายพยาธิ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ



ล้างแผล ใส่ยา กักหมา
หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบ

เมื่อถูกสุนัขกัด แมวข่วน

ต้องทำอะไร ?

ล้างแผล



ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
และสบู่ อย่างน้อย
10-15 นาที



ใส่ยา

ใส่ยาฆ่าเชื้อ



กักหมา

ตาผู้ให้ส่งตรวจ
หาเชื้อพิษสุนัขบ้า



หาหมอ

ไปพบแพทย์ทันที
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบ





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

อย่า

พียงสุนัขบ้า
เป็นแล้ว

ตาย

ถูก สุนัข-แมว

กัด-ข่วน-เลียแผล

ต้องปฏิบัติดังนี้



ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาด และสบู่
หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา

บ้ำเชื้อโพรตีนไอโอดีน
(เบตาดีน)



กักขัง

สัตว์นั้น เพื่อสังเกตอาการ
10 วัน



หาหมอ

เพื่อรักษา และฉีดวัคซีน
ให้ครบตามกำหนด



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

www.odpc9.org



ก้าวทันโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา



อย่า!บริโภค “เนื้อสัตว์” ตายผิดปกติ

เสี่ยงป่วย-ติดโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อมากได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ หมู



ทำอะไร? เมื่อสัตว์เสี่ยงป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ

- แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค
- หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน
- หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

www.odpc9.org



ก้าวทันโรคกับสกร.9 นครราชสีมา

อย่า! บริโภค “เนื้อสัตว์” ที่ตายผิดปกติ เสี่ยงป่วยติดโรคพิษสุนัขบ้า

ทำอย่างไร? เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ

- แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค
- หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน
- หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน



สัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ หมู

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

รักษาไม่หาย

เป็นแล้ว

ตาย

อย่างแน่นอน



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
www.odpc9.org



ก้าวทันโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา

